

MERS-CoV中東呼吸症候群冠狀病毒疫情

- 目前商務出差限制：無需限制
- **第二級警示(Alert)** –對當地採取加強防護：沙烏地阿拉伯
- **第一級注意(Watch)** –提醒遵守當地的一般預防措施：南韓、巴林、伊朗、約旦、阿曼、卡達、阿拉伯聯合大公國

疾管署就日前南韓移入大陸MERS-CoV確診病例，表示已掌握該病例搭乘航班的旅客名單，並交由移民署嚴密監控中，目前均無入台。另南韓衛生單位於5月30日再公布3名MERS-CoV確診病例，分別為79女性、及49歲女性與其49歲配偶，均曾與首例確診個案於醫院接觸過，隔離治療中。目前該國確診病例已累計13人，所幸尚無社區感染之虞。

MERS簡介

主要症狀：急性的嚴重呼吸系統疾病，症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難。從目前少數幾位病例的臨床資料顯示，感染者通常會有肺炎，部分病人會出現腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血（DIC）或死亡。

潛伏期：2~14天。

傳播方式：一般冠狀病毒主要透過大的呼吸道飛沫顆粒，以及直接或間接接觸到感染者分泌物等方式傳播，但MERS-CoV確實傳播途徑仍不明。根據目前研究結果推測，個案可能因接觸或吸入患病駱駝之飛沫或分泌物而感染，人與人間的傳播主要以院內感染為主，但仍無持續性人傳人的現象。另有研究指出MERS-CoV病毒可在低溫(4°C)的駱駝生乳存活72小時，部分確診病例亦曾飲用駱駝乳。

預防方法：

- 欲赴中東地區的民眾，請提高警覺並注意個人衛生及手部清潔，同時儘量減少至人群聚集或空氣不流通的地方活動，或與有呼吸道症狀者密切接觸。此外應避免前往當地農場、接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶，以降低受感染可能性。老年人或具糖尿病、慢性肺病、腎衰竭及免疫不全等慢性族群，更應謹慎做好適當防護措施。
- 自中東地區入境的民眾，若出現發燒或有急性呼吸道症狀，應主動通報港埠檢疫人員，並配合接受檢疫及後送就醫作業，進行採檢與醫學評估；返國14天內，若出現呼吸道症狀或有發燒症狀，則應佩戴一般外科口罩儘速就醫治療，並主動告知醫護人員旅遊史。
- 養成「手部衛生及咳嗽禮節」的好習慣：
 - (1)咳嗽、打噴嚏時，請用衛生紙遮住口鼻(若來不及，請以衣袖代替)，然後將紙丟進垃圾桶。
 - (2)請用肥皂和清水或酒精性乾洗手液進行手部衛生。
 - (3)有呼吸道症狀期間，請戴上口罩，並儘可能與別人距離保持1公尺以上。

一分鐘認識MERS-CoV
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

流行地區
主要集中在中東地區
以沙烏地阿拉伯病例最多

傳染途徑
駱駝傳人(接觸傳染) 人傳人(飛沫傳染)

症狀
發燒、咳嗽、呼吸急促及困難

預防方法
勤洗手、有呼吸道或發燒症狀戴口罩、避免在流行地區騎乘、接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶

有任何疑慮請打防疫專線

1922

24小時、免付費

衛生部疾病管制署 TAIWAN CDC
疫情通報及關懷專線 1922 <http://www.cdc.gov.tw>
廣告

國際疫情	國家/地區	等級	差旅建議
伊波拉病毒感染	幾內亞 獅子山共和國	第三級:警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症	沙烏地阿拉伯	第二級:警示(Alert)	對當地採取加強防護
新型A型流感	安徽省,福建省,湖南省,江蘇省,江西省,山東省,上海市,四川省,新疆維吾爾自治區,雲南省,浙江省		
伊波拉病毒感染	賴比瑞亞		
新型A型流感	北京市,甘肅省,廣東省,廣西壯族自治區,貴州省,海南省,河北省,河南省,黑龍江省,湖南省,吉林省,遼寧省,內蒙古自治區,寧夏回族自治區,青海省,山東省,山西省,陝西省,上海市,四川省,天津市,西藏自治區,新疆維吾爾自治區,雲南省,重慶市	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施
登革熱	柬埔寨 印尼 寮國 馬來西亞 緬甸 菲律賓 新加坡 泰國 越南		
麻疹	菲律賓 越南 中國大陸		
小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺	阿富汗 巴基斯坦 伊拉克 以色列 喀麥隆 赤道幾內亞 奈及利亞 索馬利亞		
新型A型流感	埃及		
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症	南韓、巴林、伊朗 約旦 阿曼 卡達 阿拉伯聯合大公國		

資料來源：台灣疾病管制署